

## MANUAL PARA PACIENTE EM QUIMIOTERAPIA



Nome: \_\_\_\_\_

Nº prontuário NEO: \_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

### ONCOLOGISTA CLÍNICO DA NEO QUE ME ACOMPANHA PRINCIPALMENTE:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ( ) Dra. Ana Paula Dergham          | (41) 99805-0699 |
| ( ) Dr. Fernando Chicoski           | (41) 99684-9787 |
| ( ) Dr. Jean Carlos Wisnieski Silva | (41) 99626-8020 |
| ( ) Dr. Júlio Cesar Figueira        | (41) 99656-6094 |

### NEO SAÚDE

Telefone: (41) 3306-1500

E-mail: [gt@neo.med.br](mailto:gt@neo.med.br) (quimioterapia); [recepcao@neo.med.br](mailto:recepcao@neo.med.br) (recepção)

Rua Desembargador Costa Carvalho, 90. Batel.

Curitiba – PR 80.440-210

[www.neo.med.br](http://www.neo.med.br)

**MEU DIAGNÓSTICO:**

**TRATAMENTO QUE ESTOU FAZENDO**

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

**ONDE FAÇO AS APLICAÇÕES DE QUIMIOTERAPIA**

**EM CASO DE EMERGÊNCIA IR PREFERENCIALMENTE AO PRONTO SOCORRO DOS HOSPITAIS:**

1. **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS\***  
ENTRADA PRONTO ATENDIMENTO: Rua Rosa Saporski, 229.  
ENTRADA INTERNAÇÕES ELETIVAS: Rua Alcides Munhoz, 433.  
Mercês. Curitiba – PR                      Tel.: (41)3240-6060
2. **HOSPITAL SANTA CRUZ\*\***  
Av. Batel, 1889. Batel. Curitiba – PR  
Tel.: (41)3312-3000

**Sempre solicitar para o médico que o atendeu no pronto socorro ligar para seu oncologista clínico.**

Qualquer dúvida quanto à quimioterapia ou sintomas, entrar em contato com a equipe de enfermagem da **Neo Saúde (3306-1500)**, de segunda-feira à sexta-feira (9h às 18h); ou ligar para seu médico oncologista. EVITAR USAR SMS OU WHATSAPP, pois estas mensagens não são adequadas para orientações médicas em caso de urgência. SEMPRE PREFERIMOS QUE O CONTATO SEJA FEITO POR LIGAÇÃO NORMAL.

\* a consulta no pronto socorro do Hospital Nossa Senhora das Graças não é coberta pelo plano de saúde, mas internamento e exames após o internamento é coberto.

\*\* Hospital Santa Cruz não atende UNIMED.

## ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM

Dicas contra náusea e vômito	Dicas contra diarreia	Dicas contra constipação
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tomar água com gotas de limão.</li> <li>✓ Comer torradas e/ou bolachas de água e sal nos intervalos das refeições.</li> <li>✓ Se alimentar em menor quantidade mais vezes ao dia.</li> <li>✓ Dormir após as sessões de quimioterapia.</li> <li>* Não tomar líquidos junto com as refeições.</li> <li>* Evitar frituras e comidas gordurosas, assim como alimentos muito quentes e muito condimentados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alimentar-se de batata, arroz, polenta, aipim cozido, carnes magras, cenoura, abobrinha, maçã s/ casca, pera sem casca, banana, torradas, pão branco, bolacha simples.</li> <li>✓ Ingerir bastante líquido, principalmente soro caseiro, água de coco natural.</li> <li>* Evitar alimentos gordurosos, integrais, muitos temperados, verduras, aveia, linhaça, grão do feijão, café, leite e derivados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optar por alimentos ricos em fibras como: laranja, mamão, ameixa, uva, vegetais e cereais integrais.</li> <li>✓ Beber mais líquidos (águas, sucos, por exemplo).</li> <li>✓ Realizar alguns exercícios físicos leves como, por exemplo, caminhada.</li> <li>✓ Estabelecer um ambiente calmo e um horário regular para evacuar.</li> </ul>

### Cuidados Gerais

- **Não tomar nenhum medicamento por conta própria** sem receita do seu médico;
- **Fazer higiene bucal** e gargarejos pelo menos 6x ao dia, com qualquer colutório sem álcool, chá de malva ou camomila. Se houver sangramento não usar escova de dente e sim cotonetes;
- Se aparecer **aftas ou feridas na boca** evitar alimentos quentes, ácidos e secos. Consultar o seu médico, enfermagem e nutricionista para o tratamento e prevenção da *mucosite (uma inflamação da parte interna da boca)*;
- O **cabelo** poderá ou não cair durante o uso do medicamento. Ele voltará a crescer quando acabar o tratamento;
- **Não falte nas aplicações de quimioterapia.** Se por algum motivo não possa vir, telefonar para remarcar sua quimioterapia imediatamente;
- A falta da menstruação pode ser ou não comum durante o tratamento. Pergunte ao médico a melhor forma de prevenção da gravidez.
- Em caso de tonturas, evitar andar sozinho e comunicar os episódios ao médico;
- **NÃO DEIXAR DE COLETAR OS EXAMES QUANDO SOLICITADO.**

### SINAIS DE ALERTA

- **Febre**, que é o mais importante sinal de infecção. Se tiver febre (**37,8°C**) avaliada com termômetro, procurar o hospital de referência ou a clínica imediatamente.
- **Sangramento** em: gengiva, nariz, urina, fezes e pontos escuros na pele que poderão aparecer sem motivo aparente; ou manchas e pintas avermelhadas na pele.
- **Diarreia**, mais de 4 vezes por dia por mais de 1 dia.
- **Desmaio, confusão mental** ou **tontura intensa**.
- **Local da aplicação** com algum sinal de dor, vermelhidão, inchaço ou ferida na pele;
- **Dor** intensa em qualquer parte do corpo;

**\* Avise imediatamente a equipe da Neo Saúde e procure os hospitais de referência**









## CATETER VASCULAR

DATA DO IMPLANTE: \_\_\_\_\_

TIPO / MARCA / MODELO: \_\_\_\_\_

ACESSO VASCULAR: ( ) Veia Subclávia – ( ) direita / ( ) esquerda

( ) V. Jugular interna – ( ) direita / ( ) esquerda

( ) outro: \_\_\_\_\_

MÉDICO QUE IMPLANTOU: \_\_\_\_\_

HOSPITAL: \_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_

O cateter totalmente implantado é um dispositivo que permite receber as medicações sem a necessidade de puncionar uma veia periférica. É destinado preferencialmente para administrar quimioterapia, mas também pode ser usado para fazer outras medicações desde que quando usado em nossos Hospitais de Referência e manipulados somente por profissionais especializados em oncologia.

O uso do cateter requer um procedimento periódico denominado “heparinização”, que consiste em lavar o cateter, injetando soro fisiológico e solução de heparina. Este procedimento é feito pela enfermeira do serviço de quimioterapia e costuma ser agendado com antecedência. Deverá ser realizado a cada 2 meses se o mesmo estiver sem uso ou no final de cada procedimento que o utilize.

Sempre que o cateter for utilizado durante internação hospitalar, solicite para a enfermeira(o) registrar na tabela ao lado.







